



SADECE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN KULLANILIR

TRICHODOLL
TRICHOPHYTON VERRUCOSUM İNFEKSİYONLARINA KARŞI
CANLI LİYOFİLİZE AŞI

ENJEKSİYONLUK SÜSPANSİYON LİYOFİLİZATI

FARMASÖTİK FORMU:

Liyofilize pelet ve sulandırma sıvısından oluşmuş enjeksiyonluk süspansiyon

AKTİF MADDELERİN ADI VE GÜCÜ İLE DİĞER YARDIMCI BİLEŞENLERİN ADI VE MİKTARLARI

AŞI KOMPOZİSYONU:

Her bir doz (ml) için minimum aşağıdaki oranlar kullanılacaktır.

Bileşenler	Miktar
Attenüye Trichophyton verrucosum kültürü	3,75x10 ⁶ - 18,75x10 ⁶ cfu/ml
Sukroz	1.875-7.5 mg/ml
Jelatin	1.25-5 mg/ml
NaCl	2.285-2.885 mg/ml
Sodyum klorid (NaCl)	8.50 mg/ml
Potasyum klorid (KCl)	0.21 mg/ml
Di sodyum fosfat dodeca hidrat (Na ₂ HPO ₄ .12H ₂ O)	2.40 mg/ml
Potasyum di hidrojen fosfat (KH ₂ PO ₄)	0.21 mg/ml
Tamamlamaya enjeksiyonluk su	1 ml

ENDİKASYONLAR:

Aşı sığırların trichophytosis infeksiyonunun önlenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla koruyucu ve tedavi edici olarak uygulanır.

KONTRENDİKASYONLAR:

Aşı yüksek ateşli, kondüsyonu düşük, zayıf ve bakımsız hayvanlara ve ağır seyreden enfeksiyonların görüldüğü sürü veya çiftliklerdeki hayvanlara uygulanmamalıdır.

YAN ETKİLER:

Aşının enjekte edildiği yerde 10-20 mm çapında birkaç hafta içerisinde kendiliğinden kaybolan yumru ortaya çıkabilir. İkinci aşılamadan 14 gün sonra enjeksiyon yerinde trichophytosis lezyonları ile beraber aynı büyüklükte (10-20 mm çapında), iki-üç hafta içerisinde kendiliğinden düşen bir kabuk oluşumu görülebilir.

HEDEF TÜRLER:

Sığırlar

HER BİR TÜR İÇİN DOZ, UYGULAMA METODU ve YOLU:

Aşı koruyucu ve tedavi edici amaçla üç ayağa kadar olan buzağılara 2 ml, 3 aylıktan büyük hayvanlara 4 ml dozunda kas içi olarak uygulanır. İkinci aşılama ilk aşılamadan 10-14 gün sonra aynı dozda tekrarlanır. Tedavinin belirtileri ikinci dozdan 20-25 gün sonra kabukların inceliş ve deriden ayrılması ve kılların yeniden çıkması ile görülür.

SADECE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN KULLANILIR

TRICHODOLL
TRICHOPHYTON VERRUCOSUM İNFEKSİYONLARINA KARŞI
CANLI LİYOFİLİZE AŞI



ENJEKSİYONLUK SÜSPANSİYON LİYOFİLİZATI

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA YASAL ARINMA SÜRESİ:

Yasal arınma süresi ette aşılamadan sonra 14 gün, süte ise 0 gündür.

AMBALAJ BÜYÜKLÜĞÜ (DOLUM HACMİ ve TOPLAM DOZ MİKTARI):

1 doz liyofilize toz içeren tip I cam flakonlar 4 ml sulandırma sıvısı ile 1'er adetlik karton kutularda
1 doz liyofilize toz içeren tip I cam flakonlar 4 ml sulandırma sıvısı ile 5x1 doz kutulu/plastik viyolde
çözücü ile birlikte strafor içinde,
2 doz liyofilize toz içeren tip I cam flakonlar 8 ml sulandırma sıvısı ile 5'er adetlik karton kutularda,
5 doz liyofilize toz içeren tip I cam flakonlar 20 ml sulandırma sıvısı ile birlikte birer adetlik karton kutularda,
10 doz liyofilize toz içeren tip I cam flakonlar 40 ml sulandırma sıvısı ile birlikte birer adetlik karton kutularda,
20 doz liyofilize toz içeren tip I cam flakonlar 80 ml sulandırma sıvısı ile birlikte birer adetlik karton kutularda

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ:

+ 2/8°C'de karanlıkta muhafaza edilir. Raf ömrü gerçek dönem stabilite çalışmalarına göre 36 aydır.

UYARILAR:

Aşı yüksek ateşli, kondüsyonu düşük, zayıf ve bakımsız hayvanlara ve diğer ağır enfeksiyonların seyrettiği sürü veya çiftliklerdeki hayvanlara uygulanmamalıdır. Parenteral olarak anti-mikotik ilaçlar veya immunsupresif ilaçlarla tedavi edilen hayvanlara uygulanmamalıdır.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER ve HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:

Liyofilize aşı kullanılmadan önce oda sıcaklığına getirilir ve sulandırma sıvısı ile iyice karıştırılarak, asepti kurallarına uygun olarak prospektüste belirtilen uygulama dozunda kas içi uygulanmalıdır. Aşı +2/+8°C'de kuru ve karanlıkta muhafaza edilmelidir. Aşığı uygulayan kişi aşılama esnasında enjeksiyona aşırı özen göstermeli, aşılama esnasında lastik eldiven kullanılmalı, aşının cilde değmesinden kaçınılmalıdır. Aşılama yüzeyi etil alkol veya katyonik bir dezenfektanla temizlenmelidir. Enjeksiyon sonrası kullanılan enjektör ve iğne ahırda bırakılmamalı, kimyasal maddeler (%37 lik formaldehitte 1 saat veya %1'lik peracetic asitte 4 saat) veya ısı ile (100°C'de 2 saat) inaktive edildikten sonra atılmalıdır. Açılmış ve sulandırılmış olan aşı 2 saat içerisinde kullanılmalıdır. Bu süre içerisinde kullanılmayan aşının kalan kısmı 100°C'de 2 saat ısıyla inaktif edilmelidir.

ATIK ve KULLANILMAYAN ÜRÜNLERİN İMHASI:

İmha edilmesi gereken aşılar 100° C'de 2 saat ısıyla muamele edilerek veya kimyasal maddeler (%2 lik ajatin çözeltisi veya %1'lik peracetic asitte 4 saat) ile inaktive edildikten sonra atılmalıdır.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız



PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ:

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN VE TARİH: 26.12.2013

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik Madde Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mehmet Nesih Özmen Mah. Kasım Sok. D Blok Apt. No:7 Güngören / İSTANBUL
Telefon: +90 212 422 02 01 Faks: +90 212 422 00 72

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ:

Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik Madde Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Koçören OSB Mahallesi 106. Cadde No:4 Eyyübiye/ŞANLIURFA
Telefon: +90 414 369 11 33 Faks: +90 414 369 16 62
E-Mail: dollvet@dollvet.com.tr/ www.dollvet.com.tr