

SADECE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN KULLANILIR

BRUDOLL-M
Conjunctival
BRUCELLA MELİTENSİS REV 1 GÖZ DAMLA AŞISI



Dollvet

ENJEKSİYONLUK SÜSPANSİYON LİYOFİLİZATI

BRUDOLL-M Conjunctival koyun ve keçilerin brusellozis'ine karşı hazırlanmış canlı attenüe liyofilize *Brucella melitensis* Rev-1 göz damla aşısı

FARMASÖTİK FORMU:

Attenüe *Brucella melitensis* Rev-1 aşı suşu ile hazırlanmış canlı liyofilize pelet ve sulandırma sıvısından oluşmuş göz damla aşısı

KOMPOZİSYONU:

Bir doz aşı (1 damla:50µl):

Attenüe <i>Brucella melitensis</i> Rev 1	0,5-2 x 10 ⁹ CFU/doz
Enzymatic digest of Proteins / Casein	0,8 mg/doz
Sukroz	1,6 mg/doz
Sodyum glutamate	0,32 mg/doz
HEPES	0,01 mmol/doz

ENDİKASYON:

3-6 aylık dişi ve erkek kuzu ve oğtaklarda brusellozis'e karşı koruyucu amaçla kullanılır. Ülke genelinde uygulanacak tüm popülasyon aşlamalarında veya hastalık riski nedeniyle ihtiyaç duyulduğunda gebe olmayan ergin dişilere ve ergin erkeklerle de uygulanır.

KONTRAENDİKASYON:

Gebe hayvanlarda aborta neden olabileceğinden uygulanması tavsiye edilmez. Ancak hastalık çıkışlarında gebeliğin son aylarında olan hayvanlara uygulanabilir.

YAN ETKİLER:

Ender de olsa dıyaryl hayvanlarda aşılardan kısa süre sonra görülebilecek anafaktik şoklara karşı adrenarjik ve antihistaminik preparatlar uygulanmalıdır. Aşı uygulanan hayvanlarda serolojik testlerde 6 aya kadar uzayabilen yalancı pozitif reaksiyonlara neden olabilir.

HEDEF TÜRÜ:

Koyun ve keçi.

UYGULAMA METODU VE YOLU:

Liyofilize aşı beraberinde verilen ve mavi renkli sulandırma sıvısı ile eritilerek homojenize edilir. Sulandırılmış aşının bulunduğu şişeye kalibreli damlalık monte edilerek kullanıma hazır hale getirilir
3-6 aylık dişi ve erkek kuzu ve oğtaklara konjunktival yolla 50±2µl (1 damla) olarak uygulanır. Ergin dişi ve ergin erkek hayvanlar için de uygulama aynıdır.

UYARILAR:

*Sulandırılan aşı en geç 6 saat içinde tüketilmelidir.

*Yüksek ısı ve güneş ışığına maruz kalmış aşılar ile ambalaj bütünlüğü bozulmuş aşılar kullanılmamalıdır.

*Aşı uygulanacak hayvanlar sağlıklı olmalıdır.

*Aşı uygulamalarında asepti ve antisepti kurallarına uyulmalıdır.

*BRUDOLL-M Conjunctival yalnızca veteriner hekim veya hekim gözetimindeki sağlık teknisyenlerince uygulanmalıdır.

SADECE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN KULLANILIR

BRUDOLL-M
Conjunctival

BRUCELLA MELITENSİS REV 1 GÖZ DAMLA AŞISI



Dollvet

ENJEKSİYONLUK SÜSPANSİYON LİYOFİLİZATI

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:

Bruceella abortus S 19 attenué suş olmasına rağmen insanlarda hastalık yapmaya muktedirdir. Dolayısı ile bakteri ile uygun biyogüvenlik önlemleri alınarak çalışılmalıdır. Aşılama esnasında eldiven kullanılmalı ve gerektiğinde kullanılmak üzere antiseptik solüsyon hazır bulundurulmalıdır. Aşının sulandırılması ve sulandırılmış aşının uygulanması esnasında hatalı uygulama, göz ve deri kontaminasyonundan kaçınılmalıdır. Kazara oluşabilecek temaslarda tıbbi müdahale aranmalıdır.

YASAL ARINMA SÜRESİ:

Aşılı hayvanların 90 gün süreyle kesilmemesi tavsiye olunur.

SAKLAMA KOŞULLARI:

Karanlıkta +2/+8°C buzdolabı ısısında

AMBALAJ ŞEKLİ:

25 doz liyofilize aşı 1,25 ml sulandırma sıvısı ve damlalıklıkla birlikte,
50 doz liyofilize aşı 2,5 ml sulandırma sıvısı ve damlalıklıkla birlikte,
100 doz liyofilize aşı 5 ml sulandırma sıvısı ve damlalıklıkla birlikte,
200 doz liyofilize aşı 10 ml sulandırma sıvısı ve damlalıklıkla birlikte.

RAF ÖMRÜ:

24 ay (2 yıl)

İMHA ŞARTLARI:

Sulandırılıp kullanılmayan aşılar 15 dakika kaynatılarak imha edilir. Liyofilize şekildeki kullanılmayan aşılar ise imha için üretici kuruma tade edilir.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 28.02.2012

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ: 28.02.2012

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Dollvet Biyoteknoloji Anonim Şirketi
Konaklar Mah. Akasyalı Sok. No:10 Beşiktaş /İSTANBUL
E-mail: dollvet@dollvet.com.tr Telefon: +90 212 422 02 01 Faks: +90 212 422 00 72

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ:

Dollvet Biyoteknoloji Anonim Şirketi
Organize Sanayi Bölgesi Koçören OSB Mahallesi 106. Caddesi No:6 Eyyübiye/SANLIURFA
E-mail: dollvet@dollvet.com.tr Telefon: +90 414 369 11 33 Faks: +90 414 369 16 62

200278/R00