



## ENJEKSİYONLUK SÜSPANSİYON LİYOFİLİZATI

## BİLEŞİMİ:

BQT Mycoplasma mycoides capri aşısı ile hazırlanmış canlı, attenué liyofilize bir aşıdır.

## Aktif maddelerin adı ve gücü ile diğer yardımcı bileşenlerin adı ve miktarları

Bir doz (0,2 ml) liyofilize aşının aktif içerikleri ve yardımcı madde miktarları

Bileşenler	Miktar	İşlev
Attenué BQT Mycoplasma mycoides capri	$\geq 2,5 \times 10^6$ CFU/doz	Antijen
Sığır beyni ve kalbi infüzyonu (BH1)	4,75 µl/doz	Koruyucu
İnaktif steril at serumu	4,75 µl/doz	
Yeast extract	0,5 mg/doz	
Penicilin G	0,5 IU/doz	
Thalium Acetate (Final Konsantrasyon)	$6,25 \times 10^{-4}$ /doz	
Glukoz	0,15 mg/doz	

Bir doz (0,2 ml) sulandırma sıvısının aktif içerikleri ve yardımcı madde

Bileşenler	Miktar	İşlev
NaCl	1,7 mg/doz	Sulandırma
Enjeksiyonluk Su	0,2 ml/doz	

## ENDİKASYONLAR:

Keçileri Keçi Çiğer Ağrısı'na karşı koruyucu amaç ile uygulanır.

## KONTRENDİKASYONLAR:

Hasta ve inkubasyon periyodundaki hayvanlara uygulanmamalıdır. Gebeliğin son 6 haftalık dönemindeki hayvanlara uygulanmamalıdır.

## YAN ETKİLER (SIKLIĞI VE ŞİDDETİ):

Herhangi bir lokal veya genel reaksiyonu yoktur.

## HEDEF HAYVAN TÜRÜ:

Keçi

## UYGULAMA DOZU, YOLU VE AŞILAMA TAKVİMİ:

- Aşı keçilerde kulağın dış yüzeyine ve kulak ucundan 2-3 cm içerideki bölgeye deri altı yolla uygulanır.
- Uygulama dozu 0,2 ml'dir.

HAYVAN TÜRÜ	AŞI UYGULAMA YERİ	AŞI DOZU ve AŞILAMA PERİYODU	
		1.AŞILAMA	2.AŞILAMA (6 ay sonra)
KEÇİ	Keçilerde kulağın dış yüzeyine ve kulak ucundan 2-3 cm içerideki bölgeye deri altı uygulanır.	0,2 ml SC	0,2 ml SC

SADECE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN KULLANILIR

# CAPRIDOLL



## Dollvet

LİYOFİLİZE KEÇİ ÇİĞER AĞRISI AŞISI

### ENJEKSİYONLUK SÜSPANSİYON LİYOFİLİZATI

#### YASAL ARINMA SÜRESİ:

Avrupa Birliği'nin 2001/82/EC sayılı direktifinin 10/2 maddesine göre aksi belirtilmedikçe yasal arınma süresi aşılamadan sonra süt için asgari 7 gün, et için asgari 28 gündür.

#### AMBALAJ BİLGİLERİ:

50 dozluk liyofilize toz içeren tip I cam flakonlar plastik viyol içinde 10 adet veya kutusuz olarak strafor içinde, 100 dozluk liyofilize toz içeren tip I cam flakonlar silikon kapaklı ve alüminyum kapaklı olarak etiketlenmiştir, liyofilize flakonlar renkli tip II cam şişelerdeki 10 ve 20 ml'lik özel sulandırma sıvısıyla birlikte.

#### RAF ÖMRÜ:

18 ay

#### SAKLAMA KOŞULLARI:

+2/8°C'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.

#### UYARILAR:

\*Ender de olsa duyarlı hayvanlarda aşılamadan kısa süre sonra görülebilecek anafaktik şoklara karşı adrenarjik ve antihistaminik preparatlar uygulanmalıdır.

#### VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜNÜ UYGULAYAN KİŞİNİN ALMASI GEREKEN SPESİFİK ÖNLEMLER:

- Aşının uygulanacağı hayvanlar sağlıklı olmalıdır.
- Aşı uygulamalarında asepti ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır.
- Beklenmeyen bir etki görüldüğünde üretici kuruma haber verilmelidir.
- Aşılamaya başlamadan önce steril bir enjektör yardımı ile 1-2 ml sulandırma sıvısı çekilerek liyofilize kültürün bulunduğu flakona verilir, flakon içeriği homojenize edilerek enjektörle sulandırma sıvısına katılıp, çalkalanarak uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
- Aşı şişesi çalkalama işlemi aşılama sonuçlanıncaya kadar aralıklar ile tekrarlanmalıdır.
- Sulandırılmış aşı en geç iki saat içerisinde kullanılmalıdır ve yarım kalan veya boşalan aşı şişeleri usulüne uygun olarak imha edilmelidir.
- Yüksek ısı ve güneş ışığına uzun süre maruz kalmış aşılar ile donmuş veya ambalaj bütünlüğü bozulmuş aşılar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Aşının ve sulandırma sıvısının uygulama sahasına nakledilmesinde ve kullanımında soğuk zincire uyulmalıdır.
- Aşı yalnızca veteriner hekim veya veteriner hekim gözetimindeki sağlık teknisyenlerince uygulanmalıdır.

**KULLANILMAYAN VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜNÜN VEYA ÜRÜNÜN KULLANIMINDAN ORTAYA ÇIKAN ATIK MATERYALİN İMHA KOŞULLARI:** Raf ömrü dolmuş, ambalaj bütünlüğü bozulmuş kapak, tıpa veya etiket orijinalliğini yitirmiş, açılmış ve saklama koşullarına uyulmadan muhafaza edilmiş aşilar yürürlükteki atık yönetmeliğine göre tıbbi atık olarak imha edilir.

"Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz" ve "Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız"

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 28.04.2008

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ: 28.04.2008

#### PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Dollvet Biyoteknoloji Anonim Şirketi  
Konaklar Mah. Akasyalı Sok. No:10 Beşiktaş /İSTANBUL  
E-mail: dollvet@dollvet.com.tr Telefon: +90 212 422 02 01 Faks: +90 212 422 00 72

#### ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ:

Dollvet Biyoteknoloji Anonim Şirketi  
Organize Sanayi Bölgesi Koçören OSB Mahallesi 106. Cadde No:6 Eyyübiye/SANLIURFA  
E-mail: dollvet@dollvet.com.tr Telefon: +90 414 369 11 33 Faks: +90 414 369 16 62