

**ENJEKSİYONLUK SÜSPANSİYON LİYOFİLİZATI VE ÇÖZÜCÜSÜ****BİLEŞİMİ:**

Her bir doz (0.5 ml) için aşağıdaki gibidir.

Enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizati

Aktif madde	Miktar	İşlevi
Atenüe SPV(Bk) LK63 suşu	$\geq 10^{2.5}$ DKID50/doz	İmmunize eden antijen
Yardımcı maddeler		
Laktalbumin hidrolizat	0.25 mg/doz	Stabilizatör
Sukroz	0.50 mg/doz	

Parenteral uygulama için çözücü

Bileşenler	Miktar	İşlevi
Sodyum klorür	8,5 mg/doz	Sulandırma sıvısı
Disodyum hidrojen fosfat heptahidrat	0,18 mg/doz	
Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat	0,06 mg/doz	
Enjeksiyonluk su	1 ml q.s.	

İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER:**Farmakoterapötik Grup:** Atenüe, liyofilize Koyun-Keçi Çiçekçi, Sığır LSD aşısı**ATC Vet Kodu:** QI02AD, QI03AD, QI04AD

POXDOLL koyun ve keçilerde koyun keçi çiçek hastalığına, sığırlarda ise sığırların nodüler ekzantemine (Lumpy Skin Hastalığı) karşı koruyucu amaçla kullanılan atenüe, liyofilize bir aşıdır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

POXDOLL koyun ve keçilerde koyun keçi çiçek hastalığına, sığırlarda ise sığırların nodüler ekzantemine (Lumpy Skin Hastalığı) karşı koruyucu amaçla kullanılır. Aşılamayı takiben 21 gün sonra hücrel ve humoral immün yanıt oluşturarak bağışıklık oluşur. Bağışıklık süresi aşılamayı takiben 3 yıldır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Liyofilize pelet üzerine çözücü ilave edilir. Köpürtmeden çalkalanır. Enjektöre çekilerek çözüciye geri ekleir. 6-12 haftalık kuzu ve oğlaklara 0,2 ml, 12 haftalıktan büyük yaştaki koyun ve keçilere 0,5 ml ve 6 aylıktan büyük sığırlara 3 ml miktarında deri altı (subcutan) yolla uygulanır. Büyükbaş hayvanlara boynun yan yüzünün orta kısmına veya omuz gerisindeki hareketsiz bölgeye, koyunlarda arka bacak iç kısmına, keçilerde kuyruk altına deri altı yolla aşılama yapılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:

- Koyun ve keçilerde 6 haftalıktan küçük genç hayvanlara aşı uygulanmaz.
- Sığırlarda aşılanmış hayvanlardan doğan buzağılar 6 aylıktan önce aşılanmamalı, aşılanmamış hayvanlardan doğan buzağılar ise 6 aylıktan önce aşılanmalıdır.
- Liyofilize aşı sulandırma sıvısı ile sulandırıldıktan sonra en geç 6 saat içinde kullanılmalıdır.
- Hasta ve inkubasyon dönemindeki sırayetten şüpheli hayvanlar ile stres altındaki hayvanlar aşılanmamalıdır.
- Aşı kullanılabacağı zaman liyofilize pelet steril enjektörler kullanılarak çözücü ile iyice çözdürülmeli ve aşı şişesi her kullanımdan önce hafifçe çalkalanmalıdır.
- Aşı uygulamadan önce oda sıcaklığına getirilmelidir.
- Aşılama sırasında aşı şişesi güneşten korunmalı, mümkünse buz içinde bulundurulmalıdır.
- Her uygulamada aseptik iğne ve enjektörler kullanılmalıdır.
- Aşı yalnızca veteriner hekim veya veteriner hekim gözetimindeki veteriner sağlık teknisyenlerince uygulanmalıdır.

Gebelik ve laktasyonda kullanım: Gebe hayvanlarda kullanımı uygundur.

POXDOLL

ATANÜE CANLI KOYUN-KEÇİ ÇİÇEK VE SİĞİR LSD AŞISI



Dollvet

ENJEKSİYONLUK SÜSPANSİYON LİYOFİLİZATI VE ÇÖZÜCÜSÜ

İSTENMEYEN ETKİLER:

Bazı hayvanlarda aşı uygulama bölgesinde yaygın (100 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az) olarak 0,2-5 cm çapında sert veya yumuşak şişlikler ve geçici bir beden ısısı yükselmesi görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Bu ürünün diğer aşılarla birlikte kullanıldığında geçimliliği hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle bu ürünün diğer ürünlerle aynı günde veya farklı zamanlarda kullanımının etkili ve güvenilir olduğu ispatlanmamıştır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDÖT:

Güvenlik çalışmalarında normal uygulama dozunun 10 katı dozu uygulamada güvenli olduğu görülmüştür.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:

Sıfır gündür.

KONTRENDİKASYONLAR:

Herhangi bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR:

"Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz." "Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız."

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:

- İnsan sağlığı için bilinen bir olumsuz etkisi yoktur, ancak aşı uygulama sırasında olabilecek yaralanmalarda bölge temizlenerek dezenfekte edilmelidir.

- Aşırı kazara kendinize enjekte etmeniz hâlinde derhal tıbbi yardıma başvurun ve ürünün kullanma talimatını veya etiketini doktorunuza gösterin.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizati: 2-8°C'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir. Dondurmayınız. Raf ömrü 36 aydır.

Parenteral uygulama için çözücü: Buzdolabına konulmadan, karanlıkta ve 25°C'den düşük sıcaklıkta muhafaza edilir. Dondurmayınız.

Raf ömrü 36 aydır. Sulandırılan aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Kullanılmış veya arta kalan ürün ve bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık materyaller ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Her türlü atık/artık materyal evsel atıklarla ve atık sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

Aşı 25, 50 ve 100 dozluk liyofilize pelet içeren Tip I renksiz cam şişelerde; parenteral uygulama için çözücü içeren 12,5 ml, 25 ml ve 50 ml Tip II amber renkli cam şişeler veya beyaz polipropilen plastik şişelerde ambalajlanır. Cam ve plastik şişeler bromobutıl tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılmış şekilde etiketlenir.

Liyofilize pelet plastik viyol içinde 20'şer adet veya kutulu/kutusuz olarak strafor içerisinde, Parenteral uygulama için çözücü münferit kutulu veya kutusuz olarak strafor içerisinde piyasaya sunulmaktadır.

PROSEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 22.05.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ: 25.06.2007

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.

Konaklar Mahallesi Akasyalı Sokak No:10 Beşiktaş/İstanbul

E-mail: dollvet@dollvet.com.tr Telefon: +90 212 422 02 01 Faks: +90 212 422 00 72

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Koçören OSB Mahallesi 106. Caddesi No:6 Eyyübiye/SANLIURFA

E-mail: dollvet@dollvet.com.tr Telefon: +90 414 369 11 33 Faks: +90 414 369 16 62