

Resolid CAT



Dollvet

RHINOTRACHEİTİS, CALİCİVİROSES VE PANLEUKOPENIA
ENFEKSİYONLARINA KARŞI KOMBİNE ATENÜE AŞI

ENJEKSİYONLUK SÜSPANSİYON LİYOFİLİZATI VE ÇÖZÜCÜSÜ

BİLEŞİMİ:

Her 1 doz aşımın içeriği aşağıdaki gibidir:

Enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizati

Aktif madde	Miktar	İşlevi
Atenüe Feline calicivirüs F9 suşu	$\geq 10^{4.5}$ DKID ₅₀ /doz*	İmmunize eden antijen
Atenüe Feline herpesvirüs tip 1 FVRm suşu	$\geq 10^{4.2}$ DKID ₅₀ /doz*	
Atenüe Feline panleukopenia Philips-Roxane suşu	$\geq 10^{4.0}$ FAID ₅₀ /doz**	
Yardımcı maddeler		
Laktalbumin hidrolizat	0,25 mg/doz	Stabilizatör
Sukroz	0,50 mg/doz	

*Doku Kültürü İnfektif Doz

**Floresan Antikor İnfektif Doz

Parenteral uygulama için çözücü

Bileşenler	Miktar	İşlevi
Sodyum klorür	8,5 mg/ml	Sulandırma sıvısı
Disodyum hidrojen fosfat heptahidrat	0,18 mg/ml	
Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat	0,06 mg/ml	
Enjeksiyonluk su	1 ml q.s.	

İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER:

Farmakoterapötik grup: Atenüe, liyofilize Feline Calicivirüs, Feline herpesvirüs, Feline panleukopenia aşısı.

ATC Vet Kodu: QJ06A04

RESOLID CAT kedilerde, Feline herpesvirüs 1 kaynaklı viral rhinotracheitis, Feline calicivirüs kaynaklı calicivirosis ve Feline panleukopenia virüs kaynaklı panleukopenia hastalıklarına karşı koruyucu amaçla uygulanan atenüe liyofilize aşıdır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

RESOLID CAT kedilerde, Feline herpesvirüs 1 kaynaklı viral rhinotracheitis, Feline calicivirüs kaynaklı calicivirosis ve Feline panleukopenia virüs kaynaklı panleukopenia hastalıklarına karşı koruyucu amaçla uygulanır. Rapeli takiben Feline calicivirüs ve Feline herpesvirüs 1 için 4 hafta sonra, Feline panleukopenia için 3 hafta sonra immün yanıt oluşturarak bağışıklık oluşur. Bağışıklık süresi aşlamayı takiben 1 yıldır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Liyofilize pelet üzerine çözücü ilave edilir. Sınırlı köpük oluşumu ile homojen bir süspansiyon elde etmek için aşırı yavaşça sulandırılır. Sulandırma sonrası pembe renkli ve berrak enjeksiyonluk süspansiyon elde edilir. Enjektöre çekilerek 8 haftalıkdan itibaren yavru kedilere ve yetişkin kedilere 1 doz (1 ml) miktarında deri altına (subcutan) yolla uygulanır. Koruyucu düzeyde bağışıklık için 4 hafta ara ile 2 kere aşılama yapılır. Aşılama her yıl tekrarlanmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:

- Hasta ve inkubasyon dönemindeki sırayetten şüpheli hayvanlar ile stres altındaki hayvanlar aşılanmamalıdır.
- Aşı kullanılacağı zaman liyofilize pelet steril enjektörler kullanılarak çözücü ile iyice çözülürmeli ve aşı şişesi kullanımdan önce hafifçe çalkalanmalıdır.
- Aşı uygulamadan önce vücut sıcaklığına getirilmelidir.
- Aşılama sırasında aşı şişesi güneşten korunmalıdır.
- Uygulamada aseptik iğne ve enjektörler kullanılmalıdır.
- Aşı yalnızca veteriner hekim veya veteriner hekim gözetimindeki veteriner sağlık teknisyenlerinde uygulanmalıdır.
- Gebelik ve laktasyonda kullanım: Gebelik ve laktasyon döneminde kullanımı önerilmemektedir.

İSTENMEYEN ETKİLER:

Hayvanlarda çok yaygın olarak enjeksiyon yerinde kısa süreli lokal reaksiyonlar (kızamıklık, hafif şişlik ve kabuklanmalar) ve vücut sıcaklıklarında geçici bir artış görülebilir. Çok seyrek olarak duyarlı hayvanlarda anafilaktik reaksiyon gelişebilir. Bu durumda semptomatik tedavi (antihistaminik/antialerjik ilaçlar) uygulanabilir.

Resolid CAT



RHINOTRACHEİTİS, CALİCİVİROSİS VE PANLEUKOPENİA
ENFEKSİYONLARINA KARŞI KOMBİNE ATENÜE AŞI

Dollvet

ENJEKSİYONLUK SÜSPANSİYON LİYOFİLİZATI VE ÇÖZÜCÜSÜ

- Çok yaygın (10 hayvanda 1'den fazla)
- Yaygın (100 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Yaygın olmayan (1.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Seyrek (10.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Çok seyrek (10.000 hayvanda 1'den az)

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Bu ürünün diğer aşılarla birlikte kullanıldığında geçimliliği hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle bu ürünün diğer ürünlerle aynı günde veya farklı zamanlarda kullanımının etkili ve güvenilir olduğu ispatlanmamıştır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDÖT:

Güvenlik çalışmalarında normal uygulama dozunun 10 katı dozu uygulamada güvenli olduğu görülmüştür.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:

Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLAR:

Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR:

"Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz." "Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız."

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:

- İnsan sağlığı için bilinen bir olumsuz etkisi yoktur, ancak aşı uygulama sırasında olabilecek yaralanmalarda bölge temizlenerek dezenfekte edilmelidir.
- Aşırı kazara kendinize enjekte etmenizi halinde derhal tıbbi yardıma başvurun ve ürünün kullanma talimatını veya etiketini doktorunuza gösterin.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Enjeksiyonluk süspansiyon liyofilizatı: 2-8 °C'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir. Dondurmayınız. Raf ömrü 24 aydır.

Parenteral uygulama için çözücü: Buzdolabına konulmadan, karanlıkta ve 25°C'den düşük sıcaklıkta muhafaza edilir. Dondurmayınız.

Raf ömrü 24 aydır. Sulandırılan aşı 2 saat içinde kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Kullanılmaz veya arta kalan ürün ve bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık materyaller ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Her türlü atık/artık materyel evsel atıklarla ve atık sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

Aşı 1 dozluk liyofilize pelet içeren 2R Tip I renksiz cam şişelerde; parenteral uygulama için çözücü içeren 1 ml 2R Tip I renksiz cam şişelerde ambalajlanır.

Cam şişeler bromobutil tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılmış şekilde etiketlenir.

Ürün plastik viyol veya kutu içerisinde 10x1 doz liyofilize pelet ve 10x1 ml parenteral uygulama için çözücü içerecek şekilde piyasaya sunulmaktadır. Tüm ambalaj şekilleri aynı anda piyasaya sunulmayabilir.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 14.10.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ: 14.10.2025

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.

Konaklar Mahallesi Akasyalı Sokak No:10 Beşiktaş/İstanbul

E-mail: dollvet@dollvet.com.tr Telefon: +90 212 422 02 01 Faks: +90 212 422 00 72

ÜRETİCİ FIRMA VE ADRESİ:

DOLLVET BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Koçören OSB Mahallesi 106. Caddesi No:6 Eyyübiye/SANLIURFA

E-mail: dollvet@dollvet.com.tr Telefon: +90 414 369 11 33 Faks: +90 414 369 16 62